



*Thema  
Bandwürmer*



# Wurmlos glücklich



**Droncit®**

# Häufig ist der Bandwurm drin

Hund und Katze können von verschiedenen Bandwurmarten befallen werden. Die Gefahr: Wurmbefall kann zu Erkrankungen des Haustieres führen und auch für den Menschen gefährlich werden.

## Eine große Familie

Es gibt etwa 3500 Bandwurm-Arten. Die wichtigsten bei Hund und Katze sind:



**Gurkenkernbandwurm**  
(*Dipylidium caninum*)  
ca. 45 cm lang



**Kleiner Fuchsbandwurm** (*Echinococcus multilocularis*)  
nur 3 mm lang



**Katzenbandwurm**  
(*Taenia taeniaeformis*)  
bis zu 60 cm lang

## Am laufenden Band

Ihren Namen verdanken Bandwürmer ihrem flachen, bandartigen Körper. Der Bandwurm wächst, indem ständig neue Bandwurm-glieder gebildet werden. Ausgewachsene Bandwürmer leben im Darm ihrer Wirte und ernähren sich dort vom reichhaltigen Angebot an Nahrung.

## Infektionsquelle „Hundeklo“

Auslaufplätze in der Stadt und „Hundeklos“ sind oft mit Wurmeiern kontaminiert. Das Aufsammeln und Entfernen des Kots hat daher eine große hygienische Bedeutung.




# Übertragung von Wirt zu Wirt

Die Entwicklung des Bandwurms beginnt mit der Ausscheidung einzelner Bandwurmglieder über den Kot von Hund und Katze und verläuft über sogenannte „Zwischenwirte“. Das können Flöhe, aber auch kleine Nager sein.

## Entwicklung des Gurkenkernbandwurms

Nach ihrer Ausscheidung trocknen die Bandwurmglieder aus, platzen auf und lassen die Eier frei. Die Eier werden von Flohlarven aufgenommen. In ihrem Inneren entwickeln sich daraus Larven.



Verschluckt und zerbeißt das Haustier einen infizierten Floh, gelangen die infizierten Stadien in den Darm. Dort wachsen sie zum Bandwurm heran, der mit der Produktion einer neuen Generation beginnt.

Beim Gurkenkernbandwurm vergehen vom Verschlucken des Flohs bis zum Ausscheiden der ersten Segmente etwa 3 Wochen.

## Bandwurmbefall vorbeugen

- Schützen Sie Ihren Vierbeiner vor Flöhen.
- Säubern Sie Ihre Schuhe/die Pfoten des Hundes, um keine Wurmeier ins Haus zu tragen. Darüber können sich auch Wohnungskatzen infizieren.
- Entwurmen Sie Ihren Vierbeiner regelmäßig.

# Der Bandwurm „frisst“ mit

Bandwürmer verankern sich mit dem Kopfbereich (Scolex) in der Darmschleimhaut und entziehen Hund und Katze wichtige Nährstoffe. Ein Bandwurmbefall kann daher gefährliche Folgen haben.

## Mögliche Folgen für den Vierbeiner

Bandwurmbefall kann zu Verdauungsstörungen führen, die mit Verstopfung oder Durchfall einhergehen. Eine verminderte Immunabwehr macht das Tier oft anfällig für andere Erkrankungen.



*Bandwurm „verankert“ sich in der Darmschleimhaut*

## Gefahren für den Menschen

Bandwürmer können beim versehentlichen Verschlucken von Bandwurmgliedern auch im Darm des Menschen heranwachsen. Die infektiösen Stadien einiger Bandwurmartarten können Organe schädigen. Besonders gefährlich ist der Fuchsbandwurm. Er verursacht die sogenannte alveoläre Echinokokkose, die zu einer lebensgefährlichen Schädigung von Organen, besonders der Leber, führen kann.

## Kinder sind besonders gefährdet

Kinder schmusen gern mit Tieren und denken dabei nicht immer an die Hygiene. So kann es passieren, dass sie das Tier streicheln und sich anschließend beispielsweise ein Gummibärchen in den Mund stecken, ohne sich vorher die Hände zu waschen.



# Tipps zur Entwurmung

Als Besitzer eines Hundes oder einer Katze können Sie dafür sorgen, dass Ihr Vierbeiner frei von Würmern bleibt – mit regelmäßiger Entwurmung. Dazu gibt es Empfehlungen der unabhängigen Expertenorganisation ESCCAP\*.

## Bei erhöhtem Risiko

Ihr Hund liebt **rohes Fleisch**, v. a. Innereien wie Leber und Lunge:

→ *Alle 6 Wochen gegen Bandwürmer behandeln*

Ihr Tier hat **unbeaufsichtigten Auslauf**, frisst wilde Nagetiere, Aas oder wird zur Jagd ausgeführt:

→ *Alle 4 Wochen gegen Bandwürmer behandeln*

Ihr Hund hatte **Flöhe**:

→ *Umgehend gegen Bandwürmer behandeln*

**Wichtig:** Regelmäßige Entwurmung ist sinnvoll, da die Behandlung gegen Bandwürmer oder andere Würmer **nicht vorbeugend** wirkt.

## Bandwurmbefall erkennen



- Reiskornähnliche, häufig bewegliche Bandwurmglieder im Kot, Fell, Afterbereich oder im Bereich der Liegeplätze.
- Rutscht das Tier mit seinem Po über den Boden (sog. „Schlittenfahren“), weist dies auf Juckreiz im Analbereich und einen möglichen Bandwurmbefall hin.

## Generell mindestens alle 3 Monate

Hunde und Katzen sollten generell mindestens alle 3 Monate mit einem Mittel gegen Rund- und Bandwürmer entwurmt werden. Ein Produkt gegen eine Mischinfektion erhalten Sie bei Ihrem Tierarzt oder auf Rezept auch in Ihrer Apotheke.

\* European Scientific Counsel of Companion Animal Parasites (ESCCAP) ist eine unabhängige Expertenorganisation von Universitätsprofessoren parasitologischer Institute, die mit verschiedenen Fachgremien zusammenarbeitet.

# Mit Droncit® gegen Bandwürmer

## Einfach und wirksam bekämpfen

- Gezielt** Droncit® bekämpft sowohl reife als auch unreife Bandwurmstadien.
- Einfach** Eine einmalige Gabe von Droncit® reicht aus, um Bandwürmer wirksam zu bekämpfen.
- Sanft** Der Wirkstoff in Droncit® ist gut verträglich. Daher kann Droncit® auch bei trächtigen und säugenden Tieren angewendet werden.

## Droncit® im 4-Punkte-Programm

Flöhe sind Hauptüberträger des Gurkenkernbandwurms. Daher gehört zu einer Flohbehandlung immer auch eine Bekämpfung des Bandwurms.

- 1. Bekämpfung der Flöhe am Tier** (z. B. mit Advantage® oder Bolfo® Flohschutz-Shampoo)
- 2. Vorbeugung eines Flohbefalls am Tier** (z. B. mit Advantage® oder Bolfo® Zecken- und Flohschutzband)
- 3. Bekämpfung der Flöhe in der Umgebung** (z. B. mit Bolfo® Umgebungsspray bzw. Fogger)
- 4. Bekämpfung des Bandwurms** (z. B. mit Droncit®)

Eine ausführliche Beratung zum Thema 4-Punkte-Programm erhalten Sie in Ihrer Apotheke.



# Die richtige Anwendung

Droncit® steht Ihnen als Tablette für Hund und Katze oder als Spot-on-Lösung für stressfreies Entwurmen bei der Katze zur Verfügung.

## Einfach in der Anwendung

Die Droncit® Tablette entweder direkt oder eingehüllt in Wurst/ Fleisch oder zerkleinert mit dem Futter verabreichen.

- Zur Entwurmung bei Hund und Katze.
- Bekämpft alle wichtigen Bandwurmart von Hund und Katze.
- Dosierung nach Körpergewicht.

Die Droncit® Spot-on-Lösung wird einfach auf die Haut im Nacken geträufelt:



*Fell scheiteln*



*Gesamte Lösung auf die Haut auftragen*

- Für besonders stressfreies Entwurmen der Katze.
- Die Katzenhaut ist dünner als die des Hundes, daher kann der Wirkstoff die Haut durchdringen.
- Zur Bekämpfung des Gurkenkern- und des Katzenbandwurms.
- Dosierung nach Körpergewicht.\*



\* nicht bei Katzen unter 1 kg Körpergewicht.

**Advantage® für Hunde, Advantage® für Katzen. Wirkstoff:** Imidacloprid. **Anwendungsgebiete:** Zur Vorbeugung und Behandlung des Flohbefalls bei Hunden und bei Katzen, sowie zur Behandlung des Haarlingbefalls bei Hunden. Nach erfolgter Diagnose durch den Tierarzt, kann das Tierarzneimittel als Teil der Behandlungsstrategie bei durch Flohstiche ausgelöster allergischer Hautentzündung (Flohallergiedermatitis, FAD) angewendet werden. Advantage® für Hunde: Innerhalb von 24 Stunden nach Anwendung von Advantage® werden die auf dem Hund befindlichen Flöhe abgetötet. Die einmalige Behandlung wirkt 4 Wochen lang gegen Flöhe. Advantage® für Katzen: Die einmalige Behandlung wirkt 3 bis 4 Wochen lang gegen Flöhe. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen sie die Packungsbeilage und fragen Sie ihren Tierarzt oder Apotheker. Bayer Vital GmbH, Geschäftsbereich Tiergesundheit, 51368 Leverkusen. Druckversion: 02 / 2011

**Bolfo® Umgebungsspray und Bolfo® Fogger gegen Flöhe bei Hunden und Katzen;** Bolfo® Umgebungsspray und Bolfo® Fogger nicht am Tier anwenden. Biozide sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen. Bayer HealthCare, Bayer Vital GmbH, Geschäftsbereich Tiergesundheit, 51368 Leverkusen. Druckversion: 08 / 2010

**Bolfo® Zecken- und Flohschutzband braun für Katzen und kleine Hunde, Bolfo® Flohschutz-Puder, Bolfo® Flohschutz-Shampoo, Bolfo® Zecken- und Flohschutz-Spray. Wirkstoff:** (2-Isopropoxyphenyl)(methylcarbamat). Für Tiere: Hunde und Katzen. **Anwendungsgebiete:** Flohschutzband: Zur Bekämpfung von Flöhen und Zecken bei Katzen und kleinen Hunden. Das Puderband setzt den Wirkstoff kontinuierlich frei. Flöhe werden innerhalb weniger Stunden nach Anlegen des Halsbandes abgetötet. Angesaugte Zecken werden nach etwa einem Tag abgetötet. Sie können dann leicht entfernt werden oder fallen spontan ab. In Einzelfällen ist während des Tragens des Halsbandes ein Befall mit Zecken möglich, die sich allerdings nur einbohren und abfallen, ohne in der Regel Blut gesaugt zu haben. Wirkungsdauer gegen Flöhe: bis zu 4 Monate. Wirkungsdauer gegen Zecken: bis zu 10 Wochen. Flohschutz-Puder und Flohschutz-Spray: Zur Bekämpfung von Flöhen bei Hunden und Katzen. Flohschutz-Shampoo: Zur Bekämpfung von Flöhen bei Hunden. **Warnhinweis:** Tiere, die ein Bolfo® Zecken- und Flohschutzband tragen, sind von Kleinkindern und Säuglingen fernzuhalten. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Tierarzt oder Apotheker. Bayer HealthCare, Bayer Vital GmbH, Geschäftsbereich Tiergesundheit, 51368 Leverkusen. Druckversion: 09/2008.

**Droncit® Spot-on Lösung zum Auftropfen auf die Haut für Katzen. Wirkstoff:** Praziquantel. **Anwendungsgebiete:** Zur Behandlung von Bandwurminfektionen der Katze. Bandwurmmittel gegen reife und unreife Darmstadien von *Dipylidium caninum* und *Taenia (Hydatigera) taeniaeformis*. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Tierarzt oder Apotheker. **Apothekenpflichtig.** Bayer HealthCare, Bayer Vital GmbH, Geschäftsbereich Tiergesundheit, 51368 Leverkusen. Druckversion: 01 / 2010

**Droncit® Tabletten. Wirkstoff:** Praziquantel. Für Tiere: Hunde, Katzen. **Anwendungsgebiete:** Bandwurmmittel zur Anwendung bei Hunden und Katzen. Gegen reife und unreife Darmstadien von *Echinococcus granulosus*, *Echinococcus multilocularis*, *Dipylidium caninum*, *Taenia ovis*, *Taenia pisiformis*, *Taenia hydatigena*, *Multiceps multiceps*, *Mesocestoides spp.*, *Hydatigera (Taenia) taeniaeformis*. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Tierarzt oder Apotheker. **Apothekenpflichtig.** Bayer HealthCare, Bayer Vital GmbH, Geschäftsbereich Tiergesundheit, 51368 Leverkusen. Druckversion: 12/2007

Wir beraten Sie gern:



Bayer HealthCare



Schutz und Pflege  
für vier Pfoten.