

Bolfo® Flohschutzband für große Hunde

Flohschutzband für große Hunde

Zur Bekämpfung von Flöhen und Zecken sowie zum Schutz vor Neubefall



| | |
|--|---|
| Wirkstoff: | Proxopur |
| Für Tiere: | Hunde |
| Zusammensetzung: | Ein Halsband zu 45 g enthält: |
| Arzneilich wirksame Bestandteile: | Propoxur 4,23 g |
| Darreichungsform: | Halsband |
| Anwendungsgebiete: | <p>Zur Bekämpfung von Flöhen und Zecken bei Hunden sowie zum Schutz vor Neubefall.</p> <p>Das Puderband setzt den Wirkstoff kontinuierlich frei. Flöhe werden innerhalb weniger Stunden nach Anlegen des Halsbandes abgetötet. Angesaugte Zecken werden nach etwa einem Tag abgetötet. Sie können dann leicht entfernt werden oder fallen spontan ab. In Einzelfällen ist während des Tragens des Halsbandes ein Befall mit Zecken möglich, die sich allerdings nur einbohren und abfallen, ohne in der Regel Blut gesaugt zu haben.</p> <p>Schutzdauer gegen Flöhe: bis zu 4 Monate Schutzdauer gegen Zecken: bis zu 10 Wochen</p> |
| Gegenanzeigen: | <p>Nicht anwenden bei kranken oder rekonvaleszenten Tieren. Nicht anwenden bei laktierenden Tieren. Nicht anwenden bei Welpen unter 3 Monaten. Nicht anwenden bei Tieren mit großflächigen Hautläsionen. Nicht bei Tieren anwenden, die der Gewinnung von Lebensmitteln dienen.</p> |
| Nebenwirkungen: | <p>Bei sehr empfindlichen Tieren kann es zu Hautirritationen und Juckreiz kommen, besonders in den ersten Tagen nach Anbringen des Bandes. Treten diese Symptome auf, sollte das Band abgenommen werden, bis die Symptome abgeklungen sind. Es ist keine besondere Behandlung notwendig.</p> |

Bolfo® Flohschutzband für große Hunde

| | |
|--|--|
| Besondere Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung: | Nur zur äußerlichen Anwendung. |
| Wechselwirkung mit anderen Mitteln: | Dem Hund nicht gleichzeitig andere Insektizide verabreichen. |
| Dosierungsanleitung mit Art und Dauer der Anwendung: | Halsband zum Befestigen am Hals. Ein Halsband pro Tier. Das Halsband aus der versiegelten Schutzpackung nehmen, entrollen und die Plastikreste von der Innenseite des Halsbandes entfernen. Das Halsband locker um den Hals des Tieres legen und, falls nötig, das überstehende Ende abschneiden. Das Band darf nicht zu eng sitzen (zwei Finger Abstand zwischen Band und Hals werden empfohlen). In den ersten Tagen nach dem Anlegen sollte die Haut im Halsbereich überprüft werden, da nicht jedes Tier den Auflagedruck eines Halsbandes verträgt. Der korrekte Sitz des Halsbandes ist regelmäßig zu kontrollieren. Die Dauer der Schutzwirkung ist abhängig von der Länge und dem Pflegezustand des Fells, von der Aktivität des Tieres sowie vom Parasitenbefall. Um bei Tieren mit struppigem, verfilztem oder verfettetem Haarkleid eine optimale Schutzwirkung zu erzielen, sollten diese Tiere vor dem Anlegen des Halsbandes shampooiert werden. Lässt die Wirkung nach, ein neues Halsband anlegen. Die Fellpflege kann wie gewohnt fortgesetzt werden. Vor dem Baden ist das Halsband dem Tier abzunehmen und erst wieder anzulegen, wenn das Tier trocken ist. Wird das Tier häufig sehr nass (Regen, Schwimmen, Baden), kann dadurch die Wirksamkeit des Halsbandes vermindert werden. |
| Überdosierung: | Die Gefahr der Überdosierung besteht aufgrund der Beschaffenheit des Medikamentes nicht. Sollte das Produkt versehentlich verschluckt werden, kann es zu Anzeichen einer Carbamatvergiftung kommen, wie vermehrter Speichelfluss, Pupillenverengung, Erbrechen oder Durchfall. In diesen Fällen sofort einen Tierarzt aufsuchen. Gegenmittel: Atropinsulfat. |
| Wartezeit: | Entfällt |
| Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Anwender: | Direkten Hautkontakt vermeiden. Beim Anbringen des Halsbandes Handschuhe tragen. Beim Umgang mit dem Tier das Halsband so wenig wie möglich anfassen. Nach dem Anfassen die Hände waschen. Empfindliche Personen sollten den Kontakt mit dem Halsband vermeiden. Warnhinweis: Tiere, die ein Bolfo Flohschutzband tragen, sind von Kleinkindern und Säuglingen fernzuhalten. |
| Dauer der Haltbarkeit des Fertigarzneimittels im unversehrten Behältnis: | 5 Jahre |
| Dauer der Haltbarkeit des Fertigarzneimittels nach Anbruch des Behältnisses: | Das Halsband ist nach Anbruch der Originalverpackung zur sofortigen Verwendung bestimmt. |
| Packungsgrößen: | Verbundverpackung aus Polyester/Polyethylen in einer Faltschachtel aus Pappe mit einem Halsband zu 45 g. |
| Besondere Vorsichtsmaßnahmen für die Beseitigung von nicht verwendeten Arzneimitteln: | Nicht aufgebrauchte Tierarzneimittel sind vorzugsweise bei Schadstoffsammelstellen abzugeben. Bei gemeinsamer Entsorgung mit dem Hausmüll ist sicherzustellen, daß kein missbräuchlicher Zugriff auf diese Abfälle erfolgen kann. Tierarzneimittel dürfen nicht mit dem Abwasser bzw. über die Kanalisation entsorgt werden. Das Halsband darf nicht in Gewässer gelangen. |
| Verschreibungspflicht / Apothekenpflicht: | Freiverkäuflich |
| Stand der Information: | März 2003 |
| Wissenswertes: | Außer den Flöhen auf dem Hund können sich in der Umgebung auch Floheier, -larven und -puppen befinden. Diese wachsen nach einiger Zeit zu neuen Flöhen heran. Für eine wirksame Flohbekämpfung müssen auch diese Stadien in der Umgebung des Hundes mit einem dafür zugelassenen Mittel bekämpft werden. |