

Tamirex[®] Plus

Umgebungsspray mit Langzeitwirkung (ca. 6 Monate) gegen Flöhe, Flohlarven und Floheier



- Zusammensetzung :** 100 g Lösung enthalten:
Wirkstoffe: 0,04 g Cyfluthrin, 0,05 g Pyriproxyfen.
Sonstige Bestandteile: Treibmittel.
- Anwendungsgebiete :** Zur Langzeitbekämpfung von Flöhen in der Umgebung der Tiere (Decken, Körbchen etc.).
- Gegenanzeigen :** Nicht am Tier anwenden.
- Dosierungsanleitung mit Art und Dauer der Anwendung :** Schlaf- und Ruheplätze der Hunde und Katzen und andere Stellen, an denen mit Flöhen und deren Entwicklungsstadien zu rechnen ist, werden einige Sekunden aus ca. 50 cm Entfernung besprüht; insbesondere Körbchen, Decken, Teppiche, Teppichböden, Fußbodenritzen und -ecken, Polster, Autositze etc. Feuchte Stellen, die beim Sprühen

Tamirex[®] Plus

	entstehen können, verschwinden nach kurzer Zeit. Bei sehr empfindlichen Materialien empfiehlt es sich, an nicht sichtbarer Stelle einen Versuch zu machen.
Art und Beschaffenheit des Behältnisses :	Sprayflasche mit 250 ml
Warnhinweise :	<p>Sprühnebel nicht einatmen! Asthmatiker sind besonders gefährdet. Sensible Personen (z.B. Allergiker oder mit vielfacher Chemikalienüberempfindlichkeit) sollten das Präparat nicht anwenden. Hautreizend.</p> <p>Biozide sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen.</p>
Wissenswertes :	<p>Flöhe stellen in der Haustierhaltung ein zunehmend größeres Problem dar. Die Entwicklung der Eier, Larven- und Puppenstadien findet nicht am Tier, sondern in der Umgebung statt. Deshalb muss bei Flohbefall auch die Umgebung behandelt werden. Die Wirkstoffe von Tamirex Plus Umgebungsspray wirken zweifach:</p> <ul style="list-style-type: none">- Ausgewachsene Flöhe sowie Larven werden sofort getötet.- Ein biologischer Wachstumsregulator verhindert die Entwicklung der Eier und Larven bis zu 6 Monaten. <p>Die beiden Wirkstoffe Cyfluthrin und Pyriproxyfen haben eine synergistische Wirkung und sichern somit eine sofortige und lang anhaltende Wirkung. Cyfluthrin gehört zu den Pyrethroiden. Es führt zu verstärktem Einstrom von Natriumionen. Eine Reizübermittlung wird unmöglich. Insekten und Spinnentiere sterben. PPF gehört zu den IGR's (Insect Growth Regulators). Es reichert sich in jedem Fett enthaltendem Gewebe an - sogar in Insekteneiern. Es unterbricht die Embryogenese, die Verpuppung oder verhindert das Schlüpfen der Insekten aus den Puppen.</p>
Zusätzliche Hinweise :	Besonders Haustiere mit Auslauf sollten zusätzlich vorbeugend gegen Flöhe geschützt werden. Flöhe können Bandwürmer auf Hunde und Katzen übertragen. Nach erfolgter Flohbekämpfung sollte daher eine Bandwurmbehandlung durchgeführt werden.

Tamirex[®] Plus

Sprühnebel nicht einatmen. Kontakt mit Haut, Augen und Schleimhäuten vermeiden. Achtung, niemals auf Tiere sprühen! Ziervögel und Haustiere während der Anwendung aus dem Raum entfernen. Aquarien abdecken. Für Kinder unzugänglich aufbewahren! Nach Anwendung Raum verlassen. Nach einer Einwirkzeit von ca. 2 Stunden ist der Raum vor Wiederbenutzung zu lüften. Dose steht unter Druck. Vor Sonnenbestrahlung und Erwärmung über 50°C schützen. Nicht in offene Flamme oder auf heiße Flächen sprühen. Dose nicht gewaltsam öffnen. Nur restlos entleerte Dosen wegwerfen. Nach Gebrauch Hände sorgfältig waschen. Eine Dose reicht für 80 m².

